

## 关于更新我院检验危急值目录（2026版）的通知

各科室：

为进一步规范临床检验危急值报告与管理工作，精准对接临床诊疗需求，降低医疗风险，保障患者医疗安全，结合我院前期临床调查意见及行业标准更新要求，医务部联合检验科完成了《肇庆市第一人民医院检验危急值目录》的修订工作，形成2026版检验危急值目录。现将有关事项通知如下：

**一、本次更新核心内容**本次危急值目录在原有基础上，对多项检验项目的参考区间、限定值、报告要求及适用科室进行了优化调整，同时新增部分危急值监测相关要求，主要更新点包括：调整血钾、高敏肌钙蛋白(HsTni)、活化部分凝血酶原时间(APTT)等项目的参考区间、项目名称及单位；明确血淀粉酶危急值限定值具体数据，新增血钠危急值报告适用的胃肠肛肠外科及胃肠肛肠外科门诊；依据行业标准，新增尿素、肌酐肾功能相关项目的危急值限定值；细化特殊科室报告要求，如血液科、胸部肿瘤科血小板计数，内分泌代谢科血乳酸等项目的专属限定值及首次报告要求；规范多项项目的危急值临床意义描述，进一步明确诊疗警示方向。

### 二、执行要求

全体临床科室、检验科及相关医技科室须严格遵照 2026 版检验危急值目录开展工作，检验科要做好危急值的检测、复核、报告工作，确保数据准确、传递及时，严格执行特殊科室、特殊项目的首次报告、专属限定值等要求。

各科室应组织医务人员开展 2026 版检验危急值目录的专项学习，确保相关人员熟练掌握各项目参考范围、限定值、临床意义及报告处置流程。

**三、执行时间：**本版检验危急值目录自发布之日起正式执行，原有检验危急值目录同时废止。

**四、其他事项**各科室在执行过程中，如发现问题或有相关建议，请及时与医务部（2102819/6819）或检验科（2102778/5778）沟通反馈，以便持续优化我院危急值管理体系。

附件：1.肇庆市第一人民医院检验危急值目录（2026 版）



## 附件：1

肇庆市第一人民医院检验危急值目录（2026）						
项目	单位	参考区间	限定值	特殊科室	临床意义	备注
血钾	mmo/L	3.5-5.1	≤2.8	—	低钾血症，呼吸肌麻痹	
			≥6.5	—	严重高钾血症，可有心律失常、呼吸麻痹	
血钙	mmo/L	2.10-2.55	<1.75	新生儿<1.50	易诱发心律失常	
			≥3.4	—	易造成高钙危象	
新生儿胆红素	μmol/L	0-180	≥300	—	新生儿溶血病	
血糖	mmol/L	3.90-6.10	≤3.0	新生儿<2.2	缺糖性神经症状，低血糖性昏迷	
			≥30	新生儿>14	高血糖性昏迷、渗透性多尿伴严重脱水和酮症酸中毒	
高敏肌钙蛋白（HsTni）	pg/ml	0-87.5	>500	—	心肌严重损伤，可能发生急性心肌梗塞	仅报首次
血淀粉酶	U/L	30-110	>300	—	可能有较严重的急性或坏死性胰腺炎的情况	
活化部分凝血酶原时间（APTT）	s	28-42.5	≥80	血液科>100	严重肝脏疾病、阻塞性黄疸、应用肝素、DIC等	
凝血酶原时间（PT）	s	11-14.5	≤8	—	高凝状态	
			≥30	—	严重的出血倾向	
纤维蛋白原（Fib）	g/L	2-4	≤1	—	严重的出血倾向	
			≥8	—	易造成脑卒中和AMI	
血红蛋白	g/L	130-175(男) 115-150(女)	≤50	—	急性大量失血或严重贫血	血液科报首次

			$\geq 200$	新生儿 $\geq 220$	RBC增多,红白血病或肺心病的可能	
白细胞计数	$10^9/L$	3.5-9.5	$\leq 2.0$	新生儿 $\leq 4.0$	有引发致命性感染的可能	
			$\geq 30$	—	急性白血病可能	
血小板计数	$10^9/L$	125-350	$\leq 50$	血液科 $\leq 20$ ; 胸部肿瘤科 $\leq 30$	可能有严重的出血倾向	仅报首次
			$\geq 1000$	—	有栓塞可能	
幼稚细胞/ 分类不明细胞	%	0	镜检发现	—	急性白血病可能	仅报首次
PCO <sub>2</sub>	mmHg	35-45	$< 10$	—	危险水平	适用于动脉血
			$> 130$	—	危险水平	适用于动脉血
PO <sub>2</sub>	mmHg	80-100	$< 55$	—	危险水平	适用于动脉血
pH	—	7.35-7.45	$< 7.15$	—	危险水平	适用于动脉血
			$> 7.55$	—	危险水平	适用于动脉血
AST	U/L	15-40(男) 13-35(女)	$\geq 800$	—	极可能存在严重的肝脏损害,进而危及生命	仅报首次
ALT	U/L	9-50(男) 7-40(女)	$\geq 800$	—		仅报首次
血胆碱酯酶	U/L	5000-12000	$< 1200$	—	重度有机磷农药中毒	
血培养	-	阴性	阳性	—	可疑微生物感染	
多重耐药菌	-	阴性	阳性		可致院内感染	同种病菌 仅报首次
脑脊液培养	-	阴性	阳性	-	脑膜炎	
血乳酸	mmol/L	0.7-2.1	$\geq 5$	仅适用内分泌代谢科、综合ICU	乳酸性酸中毒	

血钠	mmol/L	137-147	≤120	仅适用内分泌代谢科、胃肠肛肠外科、胃肠肛肠外科门诊	易发生抽搐和昏迷	
			≥155		高钠血症	
尿素	mmol/L	3.2-7.1(男) 2.5-6.1(女)	≥28.6		肾功能衰竭	仅报首次
肌酐	umol/L	58-110(男) 46-92(女)	≥650		肾功能衰竭	仅报首次